

2. En été, on voyage

Qui dit voyage, dit mal des transports. La meilleure prévention est l'habitude. De petits trajets quotidiens vont habituer un chien à voyager tranquillement.

Pour de longs trajets, il vaut mieux mettre l'animal à jeun s'il a tendance à être malade.

Vaporiser de l'huile essentielle de lavande dans l'habacle est souvent efficace.

Pour les cas rebelles, il existe des complexes homéopathiques (ex Homéovia TM) sinon votre vétérinaire vous conseillera les médicaments utiles.

Sachez que le gingembre est un excellent anti-vomitif, utilisable aussi pour les humains.

Tout autant que les humains, les chiens apprécieront des arrêts fréquents avec possibilité de se désaltérer.

Souvent on considère que les croquettes sèches sont une nourriture plus pratique pour les vacances. Il faut toutefois éviter les changements brusques de nourriture pour éviter les désordres digestifs. Selon les chiens, rien que de changer d'environnement, sans parler de menu, peut leur causer des diarrhées, donc, évitez tout stress supplémentaire.

3. En été, on va au bord de la mer

L'eau de mer est toxique, mais les chiens ne le savent pas. Diarrhées violentes, vomissements, déshydratation rapide, tout ça peut être évité en empêchant le chien de boire dans la mer. Attention aussi aux étangs à proximité de la mer, l'eau y est souvent saumâtre.

Lancer des jouets ou des bâtons sur une plage de sable peut causer l'ingestion de sable qui peut être à l'origine de diarrhées souvent sanguinolentes, voir d'occlusions intestinales.

De toute manière, la place d'un chien n'est pas à la plage en pleine journée, même sous un parasol. Préférez les promenades en début et fin de journée si vous trouvez une plage encore autorisée aux chiens...

Les coups de soleil sont à craindre pour les parties de peau lade (rose). Comme les chiens ne bronzent pas, le mieux c'est de protéger ces zones avec de l'écran total (pas de produit supermarché mais crème pour protection de cicatrices en pharmacie).

Tous les chiens savent nager, et pourtant la noyade est possible. La natation utilise beaucoup d'énergie, surtout pour un chien grand et longiligne comme le Dogue.

Si un chien qui n'a pas l'habitude de nager présente une paralysie de la queue le soir ou le lendemain d'une journée de baignade, ne vous affolez pas. Il s'agit très vraisemblablement que d'un effet de courbatures très violentes suite à la sollicitation de muscles peu utilisés en d'autres circonstances. Des anti-inflammatoires non-stéroïdiens soulagent très vite cette pseudo-paralysie.

Pharmacie de vacances :

Thermomètre
Antivomitif, antidiarrhéique
Anti-inflammatoire non-stéroïdien
Désinfectant, pommade cicatrisante
Pansements, gaze
Collyre de nettoyage pour les yeux
Crochet ou pince à tiques
Tout traitement régulier de votre animal en quantité suffisante pour toute la durée du séjour.

Et bien sûr, selon votre destination, veillez à ce que le carnet de vaccination soit à jour (vaccination antirabique, titrage d'anticorps antirabiques, certificat de bonne santé etc.)

Dr Salomé WEINGARTEN
Les Saintes Maries de la Mer
Tél : 04 90 97 78 69

La dysplasie coxo-fémorale (DCF)

Qu'est-ce que la DCF?

La dysplasie coxo-fémorale - aussi appelée dysplasie de la hanche - est une déformation de l'articulation coxo-fémorale, qui se compose de la tête du fémur et de l'acétabulum (la partie articulaire creuse du bassin recevant la tête du fémur). Dans le cas idéal l'acétabulum est profond afin de bien englober la tête du fémur, qui sera de forme régulière et arrondie. En cas de dysplasie, on constate une instabilité de l'articulation de la hanche, occasionnée par la disharmonie entre la tête fémorale et l'acétabulum. L'acétabulum peut être trop plat et ne pas bien englober la tête du fémur, qui elle peut être aussi déformée et ne pas bien s'adapter à l'articulation. Dans

les deux cas la tête du fémur ne logera pas solidement et sans laxité dans l'articulation, mais aura tendance à avoir un peu de "jeu", voire même à sortir partiellement ou totalement de l'articulation. On parle alors de subluxation ou de luxation. Selon le stade de dysplasie des lésions articulaires et du col du fémur seront visibles à la radio. La dysplasie de la hanche se développe dans les 15 premiers mois de vie du chien, et est souvent bilatérale. Les premiers symptômes de la DCF sont une douleur articulaire lorsque le chien se lève, sa démarche peut être se dandinant de l'arrière train, il peut aussi se déplacer en « sauts de lapin », ou boiter tout simplement.